

## Uitgangspunten formularium Longmedicatie

Vastgesteld ; 27 september 2018

Uitgangspunt	
Diagnostische criteria COPD/Astma en behandeldoelen	Verwijzen naar de diagnostische criteria en behandeldoelen zoals die zijn vastgelegd in de nationale richtlijnen: LAN + NHG + GOLD + GINA.
Werkzaamheid	Primair kijken naar de best geschikte inhalatoren en secundair naar de daarbij passende werkzame stoffen/moleculen.
Keuze inhalator	Wordt bepaald door vaardigheden, coördinatievermogen, inhalatiekracht en levensstijl van de patiënt. Zoveel mogelijk rekening houden met gebruiksgemak, interne weerstand van de inhalator, het risico op bijwerkingen en kosten.
Uniformiteit in toedieningsvorm	Een patiënt met meerdere inhalatoren bij voorkeur behandelen met een uniform inhalatortype. Hiermee wordt t.b.v. het gemak voor de patiënt verwarring zoveel mogelijk voorkomen tussen de verschillende devices en daarbij behorende inhalatietechniek. Uitgangspunt van het formularium is het afstemmen van inhalatoren.
Multidose	Als er keuze is dan is er in verband met het gebruiksgemak voor de patiënt voorkeur voor multidose-poederinhalatoren in plaats van singledose.
Vorzetkamer	Advies is om dosisaerosol altijd te combineren met een voorzetkamer. De Aerochamber is een goede voorzetkamer en wordt ook al veel gebruikt (nadeel jaarlijkse vervanging). De Vortex heeft voordelen m.b.t. schoonmaken (kan in afwasmachine) en meer mogelijkheden voor bediening. Nog weinig ervaring mee. Afgesproken dat aan Teva en Sandome om een factsheet wordt gevraagd en ook bij patiënten navraag wordt gedaan naar ervaringen.
Autohale/redihaler	Besloten om dit aspect niet expliciet mee te nemen, om reden van de voorkeur voor het behoud van een heldere hoofdlijn, wel enkel als uitzonderingsregel een keer te benoemen.
Combinatiepreparaat	Bij gebruik van meerdere inhalatoren kan een combinatiepreparaat worden gebruikt waarmee therapietrouw en gebruiksgemak mogelijk worden bevorderd.
Teller	De voorkeur gaat, indien mogelijk, uit naar een inhalatiemiddel (zowel bij dosisaerosol als bij poederinhalator) met een dosisteller of dosisindicator om het risico te verminderen dat de patiënt een lege inhalator gebruikt.
Inhalatie-instructie	Na opstelling van het formularium wordt in projectgroepverband afgesproken op welke manier aan de patiënt een inhalatie-instructie moet worden gegeven. Wordt vervolgd.